

Instrucciones para la preparación intestinal SUTAB

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Médico: _____ **Hora de ingreso:** _____ **Hora del procedimiento:** _____

***El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a la cancelación de su procedimiento.**

**Se le dará una receta para SUTAB que deberá llevar a su farmacia, o bien la receta se enviará a su farmacia para que usted la recoja.

Instrucciones para SUTAB

- Si toma algún AINE (por ejemplo, ibuprofeno, Aleve, naproxeno) o anticoagulantes como Coumadin, Plavix, Pradaxa, Xarelto, Cilostazol, Aggrenox, Eliquis, solicite a su médico instrucciones adicionales sobre la posible suspensión de los medicamentos antes de la colonoscopia.
- **Dos días antes del procedimiento**: NO consuma alimentos que contengan fibra, frutas o verduras crudas, ensaladas ni frutos secos.
- **El día antes del procedimiento**:
  1. Ingiera solamente líquidos claros. NO coma alimentos sólidos. NO ingiera leche ni productos lácteos. NO consuma bebidas **rojas** o **moradas** ni gelatina. NO tome jugos de verduras ni jugos con pulpa.
  2. Se requiere un total de 24 comprimidos para completar la preparación para la colonoscopia. Tomará estos comprimidos en dos dosis de 12 comprimidos cada una. Trague un (1) comprimido cada 1-2 minutos. Debe terminar los doce (12) comprimidos y los 480 ml/16 onzas de agua en 20 minutos. Debe beber agua con cada dosis de SUTAB y beber agua adicional después de cada dosis.
  3. **A las 6:00 p. m., abra un (1) frasco de 12 comprimidos.** Llene el vaso del proveedor con agua hasta la línea de llenado. Trague cada comprimido con un sorbo de agua y beba toda el agua en un plazo de 15 a 20 minutos. Una (1) hora después de tragar el último comprimido, beba 480 ml/16 onzas de agua en un plazo de 30 minutos.
  4. **A las 10:00 p. m., abra el segundo (2) frasco de 12 comprimidos.** Llene el vaso del proveedor con agua hasta la línea de llenado. Trague cada comprimido con un sorbo de agua y beba toda el agua en un lapso de 15 a 20 minutos. Una (1) hora después de tragar el último comprimido, beba 480 ml/16 onzas de agua en un lapso de 30 minutos.
  5. **No coma ni beba nada después de medianoche.**

***Nota importante:** Si experimenta náuseas, hinchazón o calambres después de tomar las tabletas, haga una pausa y reduzca la velocidad a la que bebe el agua adicional hasta que los síntomas disminuyan.*

Día de la intervención

1. **Se le administrará sedación para la prueba y DEBERÁ contar con alguien que lo lleve a su hogar. Si no cuenta con alguien que lo acompañe como conductor, no se podrá realizar el procedimiento y se reprogramará. Su conductor deberá permanecer en las instalaciones durante el procedimiento. No se puede utilizar transporte público (taxi, autobús, conductor de Uber, etc.).**
2. Si toma medicamentos para la presión arterial, la tiroides, las convulsiones o la diabetes, tómelos con solo un pequeño sorbo de agua la mañana del procedimiento.
3. No se permite conducir, beber alcohol, manejar maquinaria ni firmar ningún documento legal durante todo el día de la prueba debido a la sedación que recibirá.
4. **NO** consuma tabaco sin humo, chicle ni caramelos de menta la mañana de la intervención.
5. **NO** lleve joyas ni objetos de valor.
6. No se permite conducir, beber alcohol, manejar maquinaria ni firmar documentos legales durante todo el día de la prueba debido a la sedación que recibirá.
7. Prevea estar en el centro de 2 a 3 horas, dependiendo de la preparación, el procedimiento y el tiempo de recuperación. Prevea tomarse el día libre en el trabajo, la escuela, etc.
8. Si desea cancelar o reprogramar su procedimiento, avísenos con 72 horas de antelación para evitar cargos por cancelación.
9. ****Si toma OZEMPIC/SEMAGLUTIDE o cualquier otro agonista del receptor GLP-1, debe suspender la medicación 7 (siete) DÍAS antes de la fecha prevista para el procedimiento. Si toma este medicamento para controlar su diabetes, es posible que desee consultar con el médico que se lo recetó. Tenga en cuenta que corre el riesgo de que se cancele su procedimiento si no ha suspendido este medicamento.**

- Si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones del procedimiento, no dude en ponerse en contacto con la enfermera de su médico llamando al número que figura a continuación

Dr. Angtuaco: 501-406-9291	**Dr. Coppola**: 501-406-9301	**Dr. Coggins**: 501-406-9337
Dr. Hughes: 501-406-9311	**Dr. S. Wofford**: 501-406-9321	**Dr. J. Jones**: 501-406-9302
Dr. McElreath: 501-406-9331	**Dr. Patel**: 501-406-9341	**Dr. Svoboda**: 501-406-9351